

根色が良く、早生性、作業性に優れた秋冬どり品種

(カネコ交配)

ニンジン

こう  
紅

とく  
徳

Carrot, Koutoku Hybrid



カネコ種苗株式会社

TEL. 027(251)1611(代)

# 根色が良く、早生性、作業性に優れた秋冬どり品種

(カネコ交配)  
ニンジン

こう とく  
**紅 徳**

Carrot, Koutoku Hybrid

## ●特 性●

- (1) 夏まき秋冬どり用の品種で、適期栽培では播種後約100日で根長18~19cm、根重200g程度になります。
- (2) 地上部は立性でやや草勢が強いです。土寄せなどの管理作業が容易で、機械収穫にも適します。
- (3) 根形はややなで肩の円筒形で、尻づまりが良いです。
- (4) 根色は濃紅橙色で、肌は凹凸少なく滑らかです。食味・食感が優れるので、サラダなど生食にも向いています。
- (5) 早生性があり秋の早い時期から収穫できるので、直売所向けや家庭菜園にも適した品種です。

## ●栽培要点●

- (1) 施肥量は10a当たり窒素成分で10kgを標準としますが、多肥条件でも根部は肩張りしすぎることがなく、根形が安定しています。

このため、肥沃な圃場や果菜類の後作など、残肥が多く残っている場合でも比較的作りやすい品種です。

- (2) 発芽を安定させるために、土壤水分が十分にある時に播種を行います。覆土の厚さは0.5~1cm程度を標準とし、播種後に鎮圧をすると発芽が揃いやすくなります。播種後の乾燥に注意し、初期生育を順調にするように努めます。
- (3) 地上部は初期から旺盛に生育します。草姿が立性なので、中耕・土寄せなどの管理作業が容易です。
- (4) 黒葉枯病には中程度の耐病性がありますが、条件によっては発病が見られることがあります。葉数がやや少なく、発病すると根部の肥大に影響するため、生育初期から定期的に防除し、発病を見逃さないようにします。
- (5) 根部の吸込み性は強くありませんので、青首や冬場の凍害を防止するため、肥大期に入ってから十分に土寄せを行なって下さい。

	6	7	8	9	10	11	12	1	2
冷涼地	○	○			▨	▨			
中間地		○	○			▨	▨		
暖地			○	○			▨	▨	▨

○ 播種期 — 生育期 ▨ 収穫期

**カネコ種苗株式会社**

〒371-8503 前橋市古市町1-50-12  
TEL. 027(251)1611(代)

一般社団法人  
日本種苗協会®  
登録番号 10-001号

取扱店