

高品質で栽培しやすい晩抽性品種

(カネコ交配)

ニンジン

こう

紅

りん

琳

Carrot, Kourin Hybrid



カネコ種苗株式会社

TEL. 027(251)1611(代)

高品質で栽培しやすい晩抽性品種

(カネコ交配)
ニンジン

こう りん
紅 琳

Carrot, Kourin Hybrid

●特 性●


- (1) 中間地・暖地の春夏どり栽培、冷涼地の夏秋どり栽培に適した晩抽性品種です。中間地・暖地のトンネル栽培では1月中下旬～2月まきに最適です。冷涼地では4～6月まきまで幅広く使えます。
- (2) 適期栽培では、播種後120日で、根長17～18cm、根重200g程度になります。
- (3) 地上部は濃緑で、黒葉枯病の耐病性に優れます。
- (4) 根部は肩の肉付き・尻づまりが良い円錐形で、吸込み性が強いいため青首の発生が少ないです。
- (5) 根色は鮮やかな濃橙色で光沢に富み、肌は凹凸が少なく滑らかです。
- (6) 肉質はやや硬く、収穫機や洗浄・選別機での作業に適します。

●栽培要点●

- (1) 施肥量は慣行栽培と同じか、やや少なめの10a当たり窒素成分で10～12kgを標準とします。

- (2) 発芽を安定させるために、土壌水分が十分にある時に播種を行います。覆土の厚さは0.5～1cm程度を標準とし、播種後に鎮圧をすると発芽が揃いやすくなります。播種後の乾燥に注意し、初期生育を順調にするように努めます。
- (3) 栽培時期に応じて適切なトンネル資材や不織布を利用し、生育初期の低温と乾燥に注意します。
- (4) 地上部は黒葉枯病に耐病性を有しますが、病虫害を予防するため初期から定期的に防除します。
- (5) 収穫時期が高温になる場合は収穫遅れによる品質低下に注意します。特に中間地・暖地の6月以降の収穫や、冷涼地の8～9月収穫は、乾腐病やしみ腐病などの土壌病害が発生しやすい時期ですので、排水性の良い圃場に作付けすることや適期収穫を心がけます。また、緑肥の利用や他品目との輪作を行い、過度な連作をしないようにします。

●栽培作型●



カネコ種苗株式会社

〒371-8503 前橋市古市町1-50-12
TEL. 027(251)1611(代)

一般社団法人
日本種苗協会
会員番号 10001号

取扱店