

カネコのハクサイに新シリーズ誕生!

(カネコ交配)
ハクサイ ^き ^{ぼう} ^{ぼう}
黄望峰65
Chinese Cabbage, Kibouhou 65,Hybrid

(カネコ交配)
ハクサイ ^き ^{ぼう} ^{ぼう}
黄望峰80
Chinese Cabbage, Kibouhou 80,Hybrid

↓ 黄望峰65



↑ 黄望峰80

カネコ種苗株式会社
TEL. 027(251)1611(代)

病気に強く、早生性が優れる!
待望の早生品種

病気に強く、生理障害が少ない!
作りやすい中生品種

(カネコ交配) **黄望峰65**
ハクサイ

Chinese Cabbage, Kibouhou 65 Hybrid

(カネコ交配) **黄望峰80**
ハクサイ

Chinese Cabbage, Kibouhou 80 Hybrid

黄望峰65

●特 性●

- (1) 播種後約65日で収穫が可能な黄芯系早生ハクサイです。
- (2) ベと病、根こぶ病、軟腐病、ウイルス病に高い耐病性を持ち、栽培しやすい品種です。
- (3) 球形は、尻張りとお張り(胸張り)が優れ、箱詰めしやすい形に良く揃います。球内色は濃黄色で、褪色が遅い品種です。
- (4) カルシウム欠乏症(縁腐れ、芯腐れ)やごま症等の生理障害の発生が非常に少ないです。
- (5) カット販売だけでなく、漬物などの加工適性も非常に優れる品種です。
- (6) 中間地、冷涼地の秋の早どり栽培などでも安定生産が可能です。

●栽培作型●

	6	7	8	9	10	11
冷涼地	○	×	—	▨	▨	
中間地		○	×	—	▨	▨
暖地			○	×	—	▨

○ 播種期 × 定植期 — 生育期 ▨ 収穫期

黄望峰80

●特 性●

- (1) 播種後約80日で収穫が可能な黄芯系中生品種です。
- (2) ごま症やカルシウム欠乏症(縁腐れ、芯腐れ)等の生理障害の発生が非常に少ない品種です。
- (3) ベと病、根こぶ病、軟腐病に高い耐病性を持ち、栽培がしやすい品種です。
- (4) 球形は、尻張りとお張り(胸張り)が特に優れ、箱詰めしやすい形に良く揃います。球色は極濃緑色です。球内色は濃黄色で、褪色も遅いので、収穫後半まで高い市場性を維持します。
- (5) カット販売だけでなく、漬物などの加工適性も高い品種です。食味も優れます。

- (6) 耐寒性が優れるので、1月収穫の頭部結束栽培にも向きます。

●栽培作型●

	7	8	9	10	11	12	1
冷涼地		○	×	—	▨		
中間地		○	×	—	▨	▨	
暖地		○	×	—	▨	▨	▨

秋冬ハクサイの…

●栽培要点●

【追肥・播種期】

元肥だけに頼らず、追肥も含めた施肥設計をたてることで、生育後半まで肥効が続くようにしましょう。また、急激な肥効にならないように注意してください。良品生産、多収を狙うためにも、無理な早まきは避けましょう。

【育苗】

秋作は、苗が軟弱、徒長しやすい作型ですが、できるだけがっちりした苗を作りましょう。また、定植適期を迎えた苗は老化させないように、速やかに植えましょう。老化苗を植えると、初期生育が遅れ、十分な根群が形成されない場合、生理障害の原因にもなります。

【生理障害対策】

カルシウム欠乏症(縁腐れ、芯腐れ)の原因と対策(原因)

- ① 極端な乾燥や多湿による根傷み。老化苗定植等が原因の根量不足等。
- ② 窒素肥料等の過度施用によるカルシウム成分の吸収阻害。

(対策)

- ・ 日頃から、ハクサイの根張りが良くなるような土作りを目指すことが大切です。そのため、畑には完熟堆肥や緑肥等良質の有機質を定期的に施用し、連作畑はサブソイラー等で排水性の向上を図りましょう。
- ・ 結球初期までに、カルシウムの葉面散布を数回行うこともお勧めします。

カネコ種苗株式会社

〒371-8503 前橋市古市町1-50-12
TEL. 027(251)1611(代)

一般社団法人
日本種苗協会
会務番号 10-001号

取扱店