

白さび病に強く温暖期でも徒長が少ない、下葉が取りやすい秋～春まき用品種

(カネコ交配)

コマツナ

な  
**こいしい菜**

Komatsuna, Koishii-na Hybrid

第55回東京都種苗研究会 秋まき小松菜の部 1位受賞



**カネコ種苗株式会社**

TEL. 027(251)1611(代)

(カネコ交配)  
コマツナ

# こいしい菜

Komatsuna, Koishii-na Hybrid

●特性●

- (1)白さび病に対して非常に強い耐病性を有しています。
- (2)下葉が取れやすく、根量も少なめですので収穫から調整、出荷作業が非常に容易です。
- (3)草姿は極立性で、葉はやや小葉で葉先までまっすぐに立つので、結束や袋詰め作業が容易です。
- (4)葉色、葉柄色ともに鮮緑色で光沢に優れるので荷姿が映えます。
- (5)葉数はやや多めで、葉柄部は丸みがあり下部から上部まで同様な太さで伸びますので収量性が高いです。
- (6)温暖期でも徒長や節間伸長が少ないので、夏まき品種との切り替え時期にも最適です。

(7)極低温期はやや伸びが遅くなりますので注意が必要です。

●白さび病幼病検定結果●

くにさだ育種農場 白さび病幼苗検定結果(2012.10)

罹病度	0	1	2	3	総数	発病数	発病率(%)
罹病性品種	0	0	8	5	13	13	100
他社耐病性品種	3	2	7	0	12	9	75
いなせ菜	13	0	0	0	13	0	0
こいしい菜	13	0	0	0	13	0	0


罹病度：0=発病無し、1=病徴微小、2=病徴が接種葉の50%未満、3=病徴が接種葉の50%以上

●特性一覧表●

	最適播種期	草姿	色	光沢	早晚性	株張り	根量	低温伸張性	耐暑性	抽苔性	对白さび病	对萎黄病
こいしい菜	秋～春	極立性	鮮緑	◎	中早生	極良	3	△	○	△	◎	○

※根量：1～5→少～多


●栽培作型●



※播種時期や収穫時期は、栽培条件(天候、圃場条件、資材等)により変動しますのでご注意ください。

カネコ種苗株式会社

〒371-8503 前橋市古市町1-50-12  
TEL. 027(251)1611(代)



取扱店