

低温肥大性に優れ、根形・品質の良い、秋～冬どり用の青首ダイコン!

(カネコ交配)

ダイコン

<sup>ふゆ</sup>  
**冬** <sup>び</sup>  
**美** <sup>じん</sup>  
**人**

農林水産大臣賞受賞

Radish, Fuyubijin Hybrid



大根のおでん

カネコ種苗株式会社  
TEL. 027(251)1611(代)



# 低温肥大性に優れ、根形・品質の良い、秋～冬どり用の青首ダイコン!

ふゆ び じん

## (カネコ交配) 冬美人

Radish, Fuyubijin Hybrid

### ●特性●

- (1)根形は尻詰まりの良い総太り型となり、低温肥大性、低温伸長性に優れています。適作型での根長は37cm程度となります。
- (2)首部はやや淡い緑色、肌は滑らかで、ひげ根は細いです。また、す入りは遅く、食味が良く、青首内部の変色(青肉)は特に少ないです。
- (3)草姿は中間型、草勢は中程度、冬どり用品種としては比較的葉が小さく、密植栽培も可能です。
- (4)耐寒性が強く、葉の黄化や根の表皮の剥離は少ないです。また、萎黄病に耐病性を備えています。
- (5)作型は、暖地と中間地の9月中旬～10月上旬まき、12月～1月どり栽培、冷涼地の8月まき10月どり栽培等に適しています。中間地で1月以降に収穫する場合は後半(11月以降)にトンネル被覆が必要です。

### ●栽培作型●

	8	9	10	11	12	1	2
冷涼地	○	○	■	■			
中間地		○	○	■	■		
暖地		○	○		■	■	■

○-○ 播種期 — 生育期 ■ 収穫期

### ●栽培要点●

- (1)排水の良い畑が望ましい  
作土が深く、排水の良い畑が望ましく、深耕ロータリーやサブソイラーの利用が効果的で

す。また、前作時の有機物施用などによる土壌の物理性の改善が大切です。

### (2) 栽植密度

暖地の1月どり栽培で、畝幅48cm×株間22cm(約9,500本/10a)程度を標準とします。中間地の12月どり栽培では、畝幅54cm×株間24cm(約7,700本/10a)程度を標準とします。

葉がやや小さく、密植栽培も可能ですが、極端な密植は短根化や生育の不揃いにつながりますので注意します。

### (3) 施肥

播種直前の堆きゅう肥施用や緑肥のすき込みは避けるようにします。最低でも1ヶ月以上前に行うか、前作時に施用します。

窒素：リン酸：カリ=10～12：10～15：10～15kg/10a(成分量)程度を標準としますが、前作の残肥や土壌の肥沃度を考慮して調整します。1月以降の収穫では、追肥を1、2回行い、肥料切れに注意します。

また、ミネラル(マグネシウム、カルシウム)や微量元素(ホウ素等)の補給は十分にいきます。

### (4) 病虫害防除

播種時に粒剤(殺虫剤)を土壌混和し、虫害(キスジノミハムシ、タネバエ等)を予防します。また、間引き前後から数回、殺菌剤と殺虫剤を散布し、病虫害(わかか症、アブラムシ、コナガ等)を防除します。

未熟な有機物は病虫害の発生を助長する場合がありますので、播種直前の施用は避けるようにし、前作の残渣の片付けは早めに行うなどして注意します。

取扱店

**カネコ種苗株式会社**

〒371-8503 前橋市古市町1-50-12  
TEL. 027(251)1611(代)

一般社団法人  
日本種苗協会  
会員番号 10-001号