

トンネルから露地まで、食味は絶品！


(カネコ育成)

エダマメ

ゆ むすめ
湯あがり娘®

Green Soybeans, Yuagarimusume

(品種名 湯あがり娘)



湯あがり娘の糖含量(%)

品種	合計	ショ糖	果糖	ブドウ糖
湯あがり娘	4.19	2.30	0.77	1.12
他品種	2.03	1.58	0.22	0.23

くさだ育種農場 2000年4月播種、6月下旬測定
(成分含有量は気候、収穫時期により変動します)

カネコ種苗株式会社

TEL. 027(251)1611(代)

トンネルから露地まで、食味は絶品!

(カネコ育成) エダマメ ^ゆ湯あがり娘^{むすめ}®

Green Soybeans, Yuagarimusume

(品種名 湯あがり娘)

●特 性●

- (1) 茶豆特有の芳香を持ち、食味の良さに特に影響するショ糖含量の多い、食味抜群の品種です。
- (2) エダマメ収穫時の子実は鮮緑色、完熟種子は黄色です。毛茸は白く、ゆであがった莢・子実色は濃緑色で、市場性の高い品種です。
- (3) 3粒莢が多く、規格外品の少ない、秀品率の高い多収品種です。
- (4) 倒伏に強く、もぎやすい、作業性に優れた品種です。
- (5) 85日タイプの中早生種で、特に中間地の3月下旬から4月下旬播種のトンネル～露地マルチ作型、冷涼地の5月中旬から6月中旬播種の露地マルチ～露地作型に適します。

●栽培要点●

(1)播種

適期播種を心がけてください。むやみな早まきは過繁茂、倒伏、着莢不良の原因となりますので控えてください。適湿・適温下での播種を心がけてください。乾燥種子が急激に吸水すると、種子組織が物理的に破壊され、出芽及びその後の生育に悪影響を及ぼす恐れがあるので、播種直後の過剰灌水や降雨による湿害には特に注意が必要です。高温期のマルチ直播栽培では発芽時に高温障害が起こりやすいので、播種後に鳥害防止を兼ねて白寒冷紗等で被覆し、地温抑制に努めます。

(2)施肥

トンネル作型での多窒素は過繁茂となりますので控えめにしてください。一方、露地栽培は地力のある圃場での栽培が適し、生育後半の肥切れ防止に緩効性肥料の使用が有効です。

(トンネル・露地マルチ作型例：成分量)

N:P:K=0~6:0~20:0~20 (kg/10a)

(露地作型例：成分量)

N:P:K=8~10:25~30:25~30 (kg/10a)

※「湯あがり娘」には「ベストマッチ湯あがり娘用600」肥料が最適です。

(3)栽植様式

作型表を参照し、遅い播種期ほど株間を狭め、栽植本数を増やします。着莢性、莢品質向上のため、1本立ちが適します。

(4)適期収穫

食味の良さが持ち味の品種ですので、収穫遅れのないように注意してください。特に、高温期からは収穫適期幅が3日程度と短くなるので、無理のない播種計画を立ててください。開花後、30~35日で収穫適期になります。

●栽培作型●

	3	4	5	6	7	8	9	備考
暖地 中間地	○× (直播は4/20以降)	◎×	○	▨ (90日)	▨ (87日)	▨ (77日)	▨ (75日)	<ul style="list-style-type: none"> ●トンネル・露地マルチ作型 9220~9225黒マルチ ●露地作型 うね幅70~80cm×株間20~25cm ●5月中旬以降の播種は 結束出荷、家庭菜園向き
寒冷地			○× (直播は5/20以降)	◎	○	▨ (85日)	▨ (80日)	<ul style="list-style-type: none"> ●5月播種、露地マルチ作型 9230~9235黒マルチ ●6月播種、露地マルチ・露地作型 9220~9225黒マルチ うね幅70~80cm×株間20~30cm ●6月中旬以降の播種は 結束出荷、家庭菜園向き
寒地				◎×	○	▨ (85日)	▨ (80日)	<ul style="list-style-type: none"> ●露地作型 うね幅70~80cm×株間25~30cm

○・○ 播種期 ◎・◎ 最適播種期 ◯ トンネル × 定植期 — 生育期 ▨ 収穫期

カネコ種苗株式会社

〒371-8503 前橋市古市町1-50-12

TEL. 027(251)1611(代)

一般社団法人
日本種苗協会®
会員番号 10-001号

取扱店