

プロの農家から一般家庭菜園まで、皆が納得!

はま
早生 **浜育**
タマネギ そだち

Onion, Hamasodachi (品種名 浜育)

静岡県・中津川正数氏育成

早太りで驚異の収量性、
サラダ等生食用に最適!



カネコ種苗株式会社
TEL. 027(251)1611(代)

プロの農家から一般家庭菜園まで！ 皆が納得する食味良好な早生タマネギ品種！

早生 浜 育 タマネギ

Onion, Hama Sodachi (品種名 浜育)

●特 性●

- (1) 秋まき青切り出荷用の早生品種で、暖地4月上中旬、中間地4月下旬から5月上旬に収穫できます。
- (2) 葉身はやや長く、生育は旺盛で、作りやすい品種です。
- (3) 玉は光沢があって美しく、球形は甲高(球径比80~85程度)に良くそろいます。
- (4) 肥大性に優れ、1球重は250g前後となる豊産種です。
- (5) 抽苔や分球等の発生が少なく、安定した収量を得られます。
- (6) 玉のりん片は厚く多汁質で辛みが少なく、また肉質は繊維が少なく柔らかいので、特に食味に優れます。サラダ等の生食用に最適な品種です。

●栽培要点●

【播種・育苗】

- (1) 播種期は、暖地で9月15~20日、中間地で9月10~15日頃が適していますが、栽培地の環境を考慮して調整します。極端な早まきや大苗の定植は抽苔、分球の発生につながる恐れがありますので注意してください。
- (2) 発芽をそろえて良苗を作ることが、良品生産の第一歩です。播種後の水管理に注意します。発芽後、約10cm程度(本葉1枚目が伸びきった頃)の大きさになるまでは、根が十分発達していないので、水を切らないように注意しましょう。
- (3) 発芽直後の苗は、病害虫に弱いものです。寒冷紗等で被覆することをお勧めします。また、残暑の厳しい年には、発芽するまで黒寒冷紗等で日除けをして地温を下げます。

定植後の活着を促すため、苗床ではリン酸肥料を多く施用します。

【定植・管理】

- (1) 播種後約50日で定植適期になります。初期の根群発生を促すためにも、定植適期を厳守し、老化苗は植えないようにします。
- (2) 早生品種ですから、球の肥大期までに葉数をどれだけ確保できるかが良品生産のポイントです。年内の葉枚数は5~6枚程度が理想ですが、極端に葉枚数が不足している際には、灌水や追肥で生育を促しましょう。ただし、追肥は年内までに施用します。肥料の遅効きは却って球肥大を悪くし、玉締まりが悪くなる等、品質も低下します。茎葉病害の発生にも注意し薬剤の予防散布を心がけます。
- (3) 収穫遅れは、著しい品質低下につながります。適期収穫に努めます。

●栽培作型●

	9	10	11	12	1	2	3	4	5
暖地	○	×						■	
	○	×						■	
中間地	○	×						■	
	○	×						■	

○ 播種期 × 定植期 — 生育期 ■ 収穫期

●ワンポイント・アドバイス●

食味が良く、大変好評をいただいている「浜育」ですが、産直向けや家庭菜園用として、冷涼地(積雪のない地域に限ります)でも収穫は可能です。

8月下旬~9月初めの播種とし、厳寒期は不織布等の資材を使うことが望ましいです。

5月上中旬に、新鮮なサラダ用タマネギを収穫することができます。

カネコ種苗株式会社

〒371-8503 前橋市古市町1-50-12

TEL. 027(251)1611(代)

一般社団法人
日本種苗協会
登録番号 10-001号

取扱店