

初夏・夏どりに最適な寒玉系品種!

(カネコ交配)

キャベツ

みくに

Cabbage, Mikuni Hybrid



カネコ種苗株式会社
TEL. 027(251)1611(代)

初夏、夏どりに最適な寒玉系品種!

(カネコ交配)
キャベツ

みくに

Cabbage, Mikuni Hybrid

●特性●

- (1) 定植後約70日で収穫できる寒球系品種
定植後65~70日(播種後約95~100日)で収穫になる中早生種です。中間地・暖地の6月収穫、冷涼地の7月下旬~9月収穫において形状が扁円形にそろいます。
- (2) 玉は濃緑の扁円形
玉は濃緑色の扁円形で、球尻まで緑色になり、市場性に優れます。
- (3) 在圃性に優れる
玉のしまりが良く、球重は1.5kg程度に良くそろいます。また結球後の在圃性に優れ、一斉収穫に向きます。
- (4) 密植栽培が可能
外葉は半開張性でコンパクトにそろうため、密植栽培下でも良くそろいます。
- (5) 耐病性に優れる
萎黄病にAタイプの抵抗性で、黒腐病、バー

ティシリウム萎凋病に耐病性があります。

※ 生育の遅い苗は定植しないようにお願いします。

●栽培要点●

- (1) 施肥量
畑の肥沃度や栽培作型に応じて加減しますが、目安として10a当り窒素15~20kg、リン酸18~23kg、カリ15~20kgを基準に栽培します。
- (2) 栽植密度
畝幅55~60cm、株間30~35cmを標準とします。
- (3) 防除
中間地、暖地の6月収穫は、高温・多湿が原因で株腐病が発病しやすい時期です。対策として、畦幅を広くし地際部の蒸れを防ぐことや、薬剤防除(結球初期前後2~3回)が必要です。

●栽培作型●

中間地、暖地の1~2月播種、6月収穫、および冷涼地の3~6月播種、7~9月収穫に最適です。また、中間地、暖地の7月まき、10月下旬~11月どりも可能です。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地			○	×	○	×	○	×	○	×	○	×
中間地	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×
暖地	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×

○--○ 播種期 × 定植期 — 生育期 ▨ 収穫期

カネコ種苗株式会社

〒371-8503 前橋市古市町1-50-12
TEL. 027(251)1611(代)

一般社団法人
日本種苗協会
会員番号 10-0019

取扱店