

地力増進・減肥におすすめ

ヘアリーベッチ

まめっこ



特性・利用方法

- 旺盛な生育とアレロパシー効果により、雑草を強力に抑制します。
- 耐寒性に優れたマメ科作物で、地力増進効果が高いです。
- 4～5月に紫色の花が咲き、訪花昆虫が多く、蜜源にも利用可能です。
- 開花後は自然に枯れ、敷ワラ状になり抑草効果が持続します。
- 果樹園草生、耕作放棄地など、秋～初夏の飛砂防止、耕土保全に適します。

●播種期

暖地・中間地	9～11月・3～5月
冷涼地	9～10月・5～6月中旬

●播種量

3～4kg/10a

※春まきも可能ですが、十分な被覆効果を得るために、播種量は4～5kg/10aとします。




まめっこの根粒着生



まめっこの花

栽培体系例



● --- ● 播種期 — 生育期 ■ すき込み

ヘアリーベッチ抑草効果試験

(群馬県蚕糸技術センター)

- 播種 2000年11月
- 播種量 3kg/10a

ヘアリーベッチ「まめっこ」生育状況

調査日	草丈	草生量/10a	被覆状況
平成13.4.17	50cm	3,300kg	地表面全体
平成13.5.7	80cm	3,600kg	地表面全体

※6月初旬から枯れ始め、中旬には完全に立ち枯れた。

抑草効果

	ヘアリーベッチ以外の雑草量	指数
無処理区	1,807g	100
ヘアリーベッチ区	310g	16

2001年4月27日調査 44番桑園

カネコ種苗株式会社

本社 緑飼部/群馬県前橋市西善町689-2
〒379-2131 TEL027-253-0561 (代) FAX027-266-3221

2023年2月 作成