

耐寒・耐雪



晩生品種

ヘアリーベッチ

しげまるくん



## 栽培ポイント

- ・播種量：3～4 kg/10a 春播きの場合は、十分な被覆効果を得るため播種量 4～5kg/10a とします。
- ・注意点：播種後、覆土・鎮圧を行ってください。

後作の発芽障害を防ぐため、すき込み後、約 3～4 週間は後作物を播種しないでください。

| 地域       | 月 | 8 | 9     | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|---|-------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 暖地・中間地   |   | ● | ----- | ●  |    |    |   |   |   |   | ■ |   |   |
| 冷 涼 地    |   | ● | ----- | ●  |    |    |   |   |   |   | ■ |   |   |
| 冷涼地(北海道) | ■ | ● | ●     |    |    |    |   |   |   |   | ● | ● | ■ |

●●● 播種期 — 生育期 ■ すき込み期

## 特 性

- ・耐寒性・耐雪性に優れた晩生品種です。  
(まめっこより 4～5 週間開花が遅い品種です。)
- ・まめっこより耐寒性・耐雪性に優れ、東北、北陸、中部高冷地帯など寒冷積雪地帯に適します。
- ・アレロパシー効果により雑草を強力に抑制します。
- ・被覆による飛砂防止、耕土保全に適します。
- ・窒素固定による窒素投入が期待できます。

### ● 越冬試験：鳥取県西伯郡大山町

越冬前：2017/12/8

越冬後：2018/4/6



### ● 開花日・収量調査結果

(播種日：2017/10/18 調査日：2018/4/20)

| 作物名    | 開花始日(月/日) | 乾物収量(kg/10a) |
|--------|-----------|--------------|
| しげまるくん | 5/15      | 334          |
| 他品種 A  | 5/5       | 373          |
| まめっこ   | 4/3       | 379          |
| 他品種 B  | 4/6       | 341          |

(試験地：群馬県伊勢崎市くにさだ育種農場)

### ● 生育の様子

11月上旬

3月中旬

4月下旬




### ● 石狩農業改良普及センター

石狩北部支所試験結果

(播種日：2017/9/27 調査日：2018/6/18)

試験地：当別町当別太圃場

### 試験データ



窒素供給量(kg/10a) = 乾物収量(kg/10a) × 0.036 × 0.5  
土壌利用率を 50% とし、他品種「まめたろう」を参考に試算

お問い合わせは

**カネコ種苗株式会社**

緑飼部

〒379-2131 群馬県前橋市西善町689-2  
TEL027(253)0561(代) FAX027(266)3221