

耐暑性・萎凋病耐病性に優れる夏～初秋・春まき品種!

(カネコ交配)

ホウレンソウ

ワイルドホープ

Spinach, Wildhope Hybrid



カネコ種苗株式会社

TEL. 027(251)1611(代)

耐暑性・萎凋病耐病性に優れる夏～初秋・春まき品種!

(カネコ交配) ワイルドホープ

ハウレンソウ

Spinach, Wildhope Hybrid

●特 性●

- (1) ベと病(R-1～15、17、19)に抵抗性があります。
- (2) 葉幅が広く、光沢があります。
- (3) 高温伸長性、萎凋病耐病性に優れます。
- (4) 草姿が立性で、葉柄は柔軟性があり、収穫作業性に優れます。
- (5) 夏～初秋まき栽培に適します。


●栽培作型●

(1)冷涼地

- ・播種適期：7月中旬～9月下旬まき
3月上旬～5月上旬まき
- ・最適播種期：7月中旬～8月下旬まき
4月上旬～5月上旬まき

(2)中間地・暖地

- ・播種適期：8月下旬～10月上旬まき
2月上旬～5月上旬まき
- ・最適播種期：8月下旬～9月中旬まき
4月上旬～5月上旬まき



※北海道では4月中旬～7月末の播種は避けてください。

●品種の活かし方●

高温伸長性、萎凋病耐病性に優れるため、夏～初秋まき栽培に最適です。気温の変化にやや鈍感で温暖期でも徒長が少ないため、春まき栽培にも適します。

●栽培要点●

(1) 土壌消毒

萎凋病に強い品種ですが、連作圃場では登録農薬で土壌消毒を行うとより効果的です。

(2) ベと病の防除

べと病R-1～15、17、19に抵抗性がありますが、近年は新レースの発生が早まっているため、登録農薬の散布を含めた、総合的な防除が必要です。

(3) 灌水量管理

気象条件や土質によって最適な管理は異なりますが、灌水は原則的に日中の高温時は避けて、朝や夕方の涼しい時間帯に行ってください。播種の前で十分量の灌水を行い、発芽揃いまで適度な水分と地温を保ちます。

(4) 遮光管理

高温期の発芽促進には、播種前から予め遮光資材を展張して、地温を下げておくことが重要です。発芽揃い以降は、晴天時の日中以外は遮光を外して株を充実させることが理想ですが、高温期には栽培期間を通じて遮光することも有効です。

カネコ種苗株式会社

〒371-8503 前橋市古市町1-50-12
TEL. 027(251)1611(代)

一般社団法人
日本種苗協会
会員番号 10001号

取扱店