

べと病・黒斑細菌病に強い中早生種！

(カネコ交配)

ハクサイ

ゆめあき

ChineseCabbage, Yumeaki Hybrid



カネコ種苗株式会社
TEL. 027(251)1611(代)

べと病・黒斑細菌病に強い中早生種！

(カネコ交配)
ハクサイ

ゆめあき

Chinese Cabbage, Yumeaki Hybrid

●特 性●

- (1) 冷涼地9月中旬から10月収穫、中間地・暖地11月～12月上旬収穫に向く中早生種です。
- (2) べと病、黒斑細菌病、根こぶ病、軟腐病に強い耐病性をもちます。
※根こぶ病につきましては、優れた耐病性を持っていますが、圃場の汚染度合いやレースの種類によっては発病する可能性もあります。ご了承ください。
- (3) 芯割れ、ごま症といった生理障害の発生が少ないです。
- (4) 中早生種のなかでは、耐暑性・耐寒性ともに優れます。
- (5) スリムな草姿で、球形に優れます。
- (6) 葉枚数が比較的多いタイプです。外葉・球内ともに色が濃く、食味が優れるため、漬け物、鍋用途に最適です。

●特 性●

	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地		○	×	—	■		
中間地			○	×	—	■	
暖地			○	×	—	■	

○ 播種期 × 定植期 — 生育期 ■ 収穫期

●栽培要点●

極端な早まき・早植えは形状が縦長になる傾向があります。また、軟腐病の発生も懸念されますので、播種・定植時期に注意してください。

(1) 播種、育苗等

トレイ育苗で過度に根巻きした老化苗を定植すると、初期生育が遅れるだけでなく根張り不足から各種生理障害の原因となります。地上部の生育に見合ったバランスの良い根群を確保するためにも、畑の準備は早めに済ませて適期苗定植を心がけましょう。

(2) 生理障害について

「縁腐れ」「芯腐れ」(カルシウム欠乏症)

【対策】

●ハクサイの根が張りやすい、根傷みの少ない土作り、苗作り…

排水性、肥効の持続性が優れる土作りを目指しましょう。堆肥、緑肥の使用が効果的です。また、土壌診断結果等も加味した肥料設計の見直しも大切です。

●葉面散布…

結球初期のタイミングで、カルシウム分を葉面散布で補うことも重要です。

(3) 予防的防除のすすめ

耐病性に優れる品種ですが、昨今の異常気象に耐えられるようにサポートが必要です。生育初期～中盤は細菌病、中盤～後半は菌類病(糸状菌病/かび)が発生する傾向にあります。これらが発生する前に予防剤で防除することで、多発生環境になっても被害を減らせる可能性があります。

 **カネコ種苗株式会社**

〒371-8503 前橋市古市町1-50-12

TEL. 027(251)1611(代)

一般社団法人
日本種苗協会
登録番号 10-0011号

取扱店